

# Fluconazole B. Braun 2 mg/ml, oplossing voor infusie

fluconazol

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Garder cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autre questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

## Inhoud van deze bijsluiter

- 1. Wat is Fluconazole B. Braun en waarvoor wordt het gebruikt?
- 2. Hoe bewaart u Fluconazole B. Braun?
- 3. Hoe gebruikt u Fluconazole B. Braun?
- 4. Mogelijke bijwerkingen?
- 5. Hoe bewaart u Fluconazole B. Braun?
- 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

## 1. Wat is Fluconazole B. Braun en waarvoor wordt het gebruikt?

Fluconazole B. Braun behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd 'antischimmelmiddelen'. De actieve stof is fluconazol.

Fluconazole wordt gebruikt om infecties te behandelen veroorzaakt door schimmels en kan ook worden gebruikt om te voorkomen dat u een candida-infectie krijgt. De meest gebruikte oorzaak van een schimmelinfeksie is een gist genaamd *Candida*.

**Volvassen:**

U heeft dit geneesmiddel voorgeschreven gekregen van uw arts voor de behandeling van de volgende type schimmelinfeksies:

- Cryptosporidioomycose – een schimmelinfeksie in de hersenen
- Coccidioidomycose – een ziekte van het bronchopulmonale systeem
- Infecties veroorzaakt door *Candida* en gevonden in het bloed, organen (bijv. hart, longen) of plaswuis
- Mucosale spruw – infectie die de slijmvliezen in de mond, keel en gebit aantast

Fluconazole B. Braun kan ook aan u worden gegeven om:

- te voorkomen dat cryptosporidioomycose terugkomt
- te voorkomen dat mucosale spruw terugkomt
- te voorkomen dat u een infectie krijgt veroorzaakt door *Candida* (als uw immunsysteem zwak is en niet naar behoren werkt)

**Kinderen en adolescenten (0 tot 17 jaar oud):**

U heeft dit geneesmiddel voorgeschreven gekregen van uw arts voor de behandeling van de volgende types van schimmelinfeksies:

- Mucosale spruw – infectie die de slijmvliezen in de mond en keel aantast
- Infecties veroorzaakt door *Candida* en gevonden in het bloed, organen (bijv. hart, longen) of plaswuis
- Cryptosporidioomycose – een schimmelinfeksie in de hersenen

Fluconazole B. Braun kan ook aan u worden gegeven om:

- te voorkomen dat u een infectie krijgt veroorzaakt door *Candida* (als uw immunsysteem zwak is en niet naar behoren werkt)

## 2. Wanneer mag u Fluconazole B. Braun niet gebruiken of moet u extra voorzichtig mee zijn?

### Wanneer mag u Fluconazole B. Braun niet gebruiken?

- U bent allergisch voor Fluconazole of andere geneesmiddelen die u gebruikt om schimmelinfekties te behandelen, of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u onder rubriek 6 vinden. De symptomen kunnen bestaan uit ruik, rood worden van de huid of moeite met ademen)
- U gebruikt astemizol, terfenadine (antihistamine geneesmiddelen tegen allergieën)
- U gebruikt cisapride (voor de behandeling van maagzuur)
- U gebruikt pimozide (voor de behandeling van mentale ziekten)
- U gebruikt quinidine (voor de behandeling van hartmatigheid)
- U gebruikt erythromycine (een antibioticum voor de behandeling van infecties)

### Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Fluconazole B. Braun?

Nem contact op met uw arts voor de behandeling van Fluconazole B. Braun krijgt toegediend

- als u lijdt aan lever- of nierfunctiestoornissen
- als u lijdt aan een hartaanvaldealing waaronder hartmatigheid
- als u lijdt aan een huidaandoening in de vorm van eczeem of atopisch eczeem
- als u lijdt aan huidreacties (ziek, rood worden van de huid of moeite met ademen) krijgt u een tekenen van "beïnvloedingsinsufficiëntie" ontwikkeld, waarbij de huid niet voldoende produceren van bepaalde steroidohormonen, zoals cortisol (chronische of langdurige vermoeidheid, spierzwakheid, verminderde eetlust, gewichtswijzigingen, buikpijn)
- als u ooit een ernstige huidaandoening of huidafschilfering, blaarvorming en/of wondjes in de mond heeft gehad met de gebruik van Fluconazole B. Braun
- als de schimmelinfeksie niet beter wordt, omdat mogelijk een andere behandeling tegen schimmels nodig is

Er zijn verschillende artsen die kunnen reageren met Fluconazole B. Braun. Zorg ervoor dat uw arts weet of u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- rifampicine, rifabutine of aztreomycine (antibiotica voor infecties)
- atroposic eczeem
- afeleptan, fentanyl (gebruikt als verdoving)
- amiodaron (gebruikt voor de behandeling van onregelmatige hartslag, "aritmie")
- amitriptiline, nortriptyline (gebruikt als anti-depressivum)
- amfoteracine B, voriconazol (anti-schimmel)

Geneesmiddelen die het bloed verduinen om bloedstolsels te voorkomen (warfarine of vergelijkbare medicijnen)

• benzodiazepines (midazolam, triazolam of vergelijkbaar geneesmiddelen) gebruikt om u te kalmeren

• carbamazepine, fenytone (gebruikt voor de behandeling van epilepsie)

• nifedipine, isradipine, amiodipine, felodipine, verapamil, hydrochlorothiazide (een diureticum) en losartan (voor hypertensie-hoge bloeddruk)

• olaparib (gebruikt voor de behandeling van eierstokkanker)

• ciclesponsor, everolimus, simrolimus of tacrolimus (om afstorting van transplantaten te voorkomen)

• cyclosporamide, vinca-alkaloiden (vincristine, vinblastine of vergelijkbare geneesmiddelen) gebruikt voor de behandeling van kanker

• halofanfone (gebruikt voor de behandeling van malaria)

• statines (atorvastatine, simvastatine, fluvastatine of vergelijkbare geneesmiddelen) gebruikt voor het terugbrengen van de hoge cholesterol

• methadon (gebruikt voor pijn)

• celecoxib, ibuprofeen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's))

• orale anticoagulants

• zibofenadine, ook wel bekend als AZT, saquinavir (gebruikt bij HIV-gedreven patiënten)

• pentoximezuur voor diabeteschalen glibenclamide, glijpizide en tolbutamide

• theophylline (gebruikt om astma onder controle te houden)

• tofacitinib (gebruikt voor de behandeling van artrose)

• tolvaptan, gebruikt voor de behandeling van hyponatriemie (laag natriumgehalte in het bloed) of voor het vertragen van de achteruitgang van de nierfunctie

• vitamine A (voedingssupplement)

• ivacaftor (alleen of gekombineerd met andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van cystische fibrose)

• ibritumomab gebruikt voor de behandeling van bloedanker

• lurasidone (gebruikt voor de behandeling van schizofrenie)

**Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of geneesmiddelen gebruikt.

Als u een plan bent zwanger worden, wordt aanbevolen na een enkelvoudige dosis fluconazole een week te wachten voordat u zwanger wordt.

Heeft u een langere behandelingskuur met fluconazole voorgeschreven gekregen? Dan is het nodig passende anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling en vervolgens gedurende één week na de laatste dosis. Neem daarom contact op met uw arts.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Dan mag u dit middel niet gebruiken, behalve wanneer uw arts heeft gezegd dat het toch moet gebruiken. Wordt u zwanger tijdens het gebruik van dit geneesmiddel of binnen 1 week na de meest recente dosis? Neem dan contact op met uw arts.

Als u fluconazole in de eerste of tweede maanden van de zwangerschap gebruikt, kunt u een groter risico hebben op gebrek aan geboren afwijkingen. Als u in de eerste drie maanden van de zwangerschap fluconazole inneemt, kunt u een grotere kans hebben dat uw baby wordt geboren met afwijkingen van het hart, de botten en/of de spieren.

Er zijn meldingen van baby's die geboren zijn met aangeboren afwijkingen aan de schedel, oren en botten van de dij en de elleboog. Dit was bij vrouwen die drie maanden of langer hogere doses fluconazel (400-800 mg per dag) hebben gekregen voor coccidioidomycose. Het verband tussen fluconazole en deze gevallen is niet duidelijk.

U kunt borstvoeding blijven geven na een enkele dosis fluconazel van 150 mg.

U mag geen borstvoeding geven als u een heerhadoos van fluconazel gebruikt.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Bij het besturen van voertuigen of bedieningen van machines moet rekening worden gehouden dat er soms duizelingen of doven kunnen optreden.

### Fluconazole B. Braun bevat natrium

Dit middel bevat 177 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per fles van 50 ml. Dit komt overeen met 8,9 % van de aanbevolen maximale dagelijke hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.

Dit middel bevat 354 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per fles van 100 ml. Dit komt overeen met 17,7 % van de aanbevolen maximale dagelijke hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.

Dit middel bevat 709 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per fles van 200 ml. Dit komt overeen met 35,5 % van de aanbevolen maximale dagelijke hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.

### 3. Hoe gebruikt u Fluconazole B. Braun?

Een arts of ander medisch personeel dient dit geneesmiddel toe als een langzame injectie (infusie) in uwader. Fluconazole B. Braun wordt geleverd als een oplossing. Het wordt niet verder verduld. Er is meer informatie voor gezondheidszorgpersoneel in een rubriek aan het einde van deze bijsluiter.

De aanbevolen doses van dit geneesmiddel tegen verschillende infecties staan hieronder. Check bij uw arts of verpleegster u of u niet zeker weet waarom Fluconazole B. Braun aan u gegeven wordt.

**Volvassen:**

Als u de volgende geneesmiddelen gebruikt kan Fluconazole B. Braun de volgende effecten veroorzaken:

- rifampicine, rifabutine of aztreomycine (antibiotica voor infecties)
- afeleptan, fentanyl (gebruikt als verdoving)
- amiodaron (gebruikt voor de behandeling van onregelmatige hartslag, "aritmie")
- amitriptiline, nortriptyline (gebruikt als anti-depressivum)
- amfoteracine B, voriconazol (anti-schimmel)

Geneesmiddelen die het bloed verduinen om bloedstolsels te voorkomen (warfarine of vergelijkbare medicijnen)

• benzodiazepines (midazolam, triazolam of vergelijkbaar geneesmiddelen) gebruikt om u te kalmeren

• carbamazepine, fenytone (gebruikt voor de behandeling van epilepsie)

• nifedipine, isradipine, amiodipine, felodipine, verapamil, hydrochlorothiazide (een diureticum) en losartan (voor hypertensie-hoge bloeddruk)

• olaparib (gebruikt voor de behandeling van eierstokkanker)

• ciclesponsor, everolimus, simrolimus of tacrolimus (om afstorting van transplantaten te voorkomen)

• cyclosporamide, vinca-alkaloiden (vincristine, vinblastine of vergelijkbare geneesmiddelen) gebruikt voor de behandeling van kanker

• halofanfone (gebruikt voor de behandeling van malaria)

• statines (atorvastatine, simvastatine, fluvastatine of vergelijkbare geneesmiddelen) gebruikt voor het terugbrengen van de hoge cholesterol

• methadon (gebruikt voor pijn)

• celecoxib, ibuprofeen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's))

• orale anticoagulants

• zibofenadine, ook wel bekend als AZT, saquinavir (gebruikt bij HIV-gedreven patiënten)

• amiodaron, isradipine, amiodipine, felodipine, verapamil, hydrochlorothiazide (een diureticum) en losartan (voor hypertensie-hoge bloeddruk)

• amitriptiline, nortriptyline (gebruikt als anti-depressivum)

• amfoteracine B, voriconazol (anti-schimmel)

• amphotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidomycose)

• amfotericine B, amphotericine B (gebruikt voor de behandeling van de coccidioidom

Indication	Dosis quotidienne
Candidose buccale et infections de la gorge provoquées par <i>Candida</i> ; la dose et la durée dépendent de la sévérité et du site de l'infection.	3 mg par kg de poids corporel une fois par jour (16 mg par kg de poids corporel peuvent être administrés le premier jour).
Méningite cryptococcique ou infections fongiques internes provoquées par <i>Candida</i>	6 à 12 mg par kg de poids corporel une fois par jour.
Prévention des récidives de méningite crypto-coccique	6 mg par kg de poids corporel une fois par jour.
Prévention des infections provoquées par <i>Candida</i> chez l'enfant (si son système immunitaire est affecté et ne fonctionne pas correctement)	3 à 12 mg par kg de poids corporel une fois par jour.

**Utilisation chez les enfants âgés de 0 à 3 semaines**

Utilisation chez les enfants âgés de 3 à 4 semaines : Même dose que ci-dessus, mais administrée une fois tous les 2 jours. La dose maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 48 heures.

Utilisation chez les enfants âgés de moins de 3 semaines : Même dose que ci-dessus, mais administrée une fois tous les 3 jours. La dose maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 72 heures.

**Personnes âgées**

La dose adulte habituelle doit être administrée à moins que vous ne souffriez de problèmes rénaux.

**Patients souffrant de problèmes rénaux**

Selon l'état de votre fonction rénale, votre médecin peut modifier votre dose.

**Si vous avez pris plus de Fluconazole B. Braun que vous n'auriez dû**

Si vous avez utilisé ou pris trop de Fluconazole B. Braun, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Lors d'un surdosage, vous pouvez entendre, voir, ressentir ou penser des choses qui ne sont pas réelles (hallucinations et comportement paranoid).

**Si vous oubliez de prendre Fluconazole B. Braun**

Etant donné que vous recevez ce médicament sous stricte surveillance médicale, il est improbable qu'une dose soit oubliée. Cependant, avisez votre médecin ou pharmacien si vous pensez qu'une dose a été oubliée.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmière/re.

**4. Quels sont les effets indésirables eventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Arrêtez d'utiliser Fluconazole B. Braun et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des symptômes suivants :

- Eruption cutanée généralisée, température corporelle élevée et ganglions lymphatiques enflés (syndrome DRESS ou syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse).

Quelques personnes développent des réactions allergiques, bien que les réactions allergiques graves soient rares (elles peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 100). Avertissez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants :

- Subtilisation, respiration sifflante, difficultés respiratoires ou oppression dans la poitrine
- Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres
- Démangeaison sur tout le corps, rousseurs de la peau ou points rouges qui démangent
- Réactions cutanées sévères telles qu'une éruption cutanée entraînant la formation de vésicules (celle-ci peut toucher la bouche et la langue)

Fluconazole B. Braun peut affecter le foie. Les signes des problèmes hépatiques comprennent :

- Fatigue
- Perte d'appétit
- Vomissements
- Jaunissement de la peau ou du blanc des yeux (jaunisse)

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, arrêtez de prendre Fluconazole B. Braun et avertissez immédiatement votre médecin.

**Autres effets indésirables :**

Si l'un des effets indésirables suivants s'aggrave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

Les effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) sont les suivants :

- Maux de tête
- Maux d'estomac, diarrhée, nausées, vomissements
- Augmentation des résultats d'analyse de sang concernant la fonction hépatique
- Eruption cutanée

Les effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) sont les suivants :

- Réduction du nombre de globules rouges, ce qui peut rendre la peau pâle et entraîner une faiblesse ou un essoufflement
- Perte d'appétit
- Incapacité à dormir, somnolence
- Convulsions, étourdissements, tête qui tourne, fourmillements, picotements ou engourdissement, modifications du goût
- Toux ou toux difficile, gaz, bouché, sécher
- Atteinte hépatique et jaunissement de la peau et des yeux (jaunisse)
- Papules, formation de vésicule (urticaire), démangeaisons, augmentation de la sudation
- Fatigue, sensation générale de mal-être, fièvre

Les effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) sont les suivants :

- Nombre anormalement bas de globules blancs (cellules qui permettent de se défendre contre les infections) et de plaquettes (cellules sanguines permettant d'arrêter les saignements)
- Coloration rouge ou violette de la peau, qui peut être provoquée par un nombre faible de plaquettes ou par des modifications du nombre d'autres cellules sanguines
- Changements au niveau des analyses de sang (taux élevés de cholestérol dans le sang, graisses)
- Tremblements
- Taux de potassium sanguin bas
- Electrocardiogramme (ECG) abnormal, modification de la fréquence cardiaque ou du rythme cardiaque
- Insuffisance hépatique
- Réactions allergiques (parfois sévères), comprenant une éruption cutanée étendue avec formation de vésicules et une peau qui pèle sur de grandes surfaces, des réactions cutanées sévères, un gonflement des lèvres ou du visage
- Chute des cheveux

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, www.afmps.be

Division Vigilance : Site internet : www.notifieruneeffetindesirable.be, e-mail : adr@fag-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**DE - Gebrauchsinformation: Information für Anwender****Fluconazole B. Braun 2 mg/ml Infusionslösung****Fluconazol**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen:**

- Nehmen Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

**Was ist in dieser Packungsbeilage steht?**

- 1. Was ist Fluconazole B. Braun und wofür wird es angewendet?
- 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Fluconazole B. Braun beachten?
- 3. Wie ist Fluconazole B. Braun anzuwenden?
- 4. Welche Nebenwirkungen kann es geben?
- 5. Wie ist Fluconazole B. Braun aufzubewahren?
- 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**1. Was ist Fluconazole B. Braun und wofür wird es angewendet?**

Fluconazole B. Braun gehört zur Arzneimittelgruppe der so genannten Antimykotika (Mittel gegen Pilzinfektionen). Es enthält den Wirkstoff Fluconazol.

Fluconazol wird zur Behandlung von Pilzinfektionen eingesetzt und kann auch zur Vorbeugung von Infektionen mit dem Hefepilz *Candida* verwendet werden. *Candida* ist der häufigste Erreger von Pilzinfektionen.

**Erwachsene**

Ihr Arzt hat Ihnen dieses Arzneimittel möglicherweise zur Behandlung einer der folgenden Pilzinfektionen verordnet:

- Kryptoskleren-Meningitis – eine Pilzinfektion im Gehirn
- Kryptoskleromykose – eine Erkrankung von Lungen und Atmewegen
- Candida-Infektionen von Blutbahn, inneren Organen (z.B. Herz und Lungen) oder Hamartakt
- Spor – Candida-Infektion der Schleimhäute, die Mundhöhle und den Rachenraum auskleiden (hiervon gehört z.B. auch die Prosthesentomatis, eine Infektion bei Zahnpfostenträgern)

Oder Sie haben Fluconazole B. Braun aus einem der folgenden Gründen verordnet:

- Um die Rückkehr einer Kryptoskleren-Meningitis zu verhindern
- Um die Rückkehr einer Candida-Infektion der Schleimhäute (Soor) zu verhindern
- Um zu verhindern, dass Sie an einer Candida-Infektion erkranken (wenn Ihr Immunsystem ge schwächt ist und nicht richtig arbeitet)
- Um die Rückkehr einer Kryptoskleren-Meningitis zu verhindern

Kinder und Jugendliche (0 bis 17 Jahre)

Möglicherweise wurde dieses Arzneimittel zur Behandlung einer der folgenden Pilzinfektionen verordnet:

- Soor – Candida-Infektion der Schleimhäute, die Mundhöhle und den Rachen auskleiden
- Candida-Infektion von Blutbahn, inneren Organen (z.B. Herz und Lungen) oder Hamartakt
- Kryptoskleren-Meningitis – eine Pilzinfektion im Gehirn

Oder Sie haben Fluconazole B. Braun aus einem der folgenden Gründe verordnet:

- Zur Vorbeugung einer Candida-Infektion (wenn das Immunsystem des Patienten/der Patientin geschwächt ist und nicht richtig arbeitet)
- Um die Rückkehr einer Kryptoskleren-Meningitis zu verhindern

Was sollte vor der Anwendung von Fluconazole B. Braun beachten?

**Fluconazole B. Braun darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Fluconazol, gegen andere Arzneimittel zur Behandlung von Pilzinfektionen oder gegen einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind. Zu den Symptomen einer Allergie gehören Juckreiz, Hautrötung und Atemnot.
- wenn Sie Astemizol oder Terfenadin anwenden (Antihistaminika zur Behandlung von Allergien)
- wenn Sie Cisaprid anwenden (gegen Magenbeschwerden)
- wenn Sie Cisplatin anwenden (zur Behandlung von Herzmuskelbeschwerden)
- wenn Sie Echinidin anwenden (zur Behandlung von Herzmuskelbeschwerden)
- wenn Sie Erythromycin anwenden (ein Antibiotikum zur Behandlung von Infektionen)

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Fluconazole B. Braun anwenden.
- wenn Sie Probleme mit Ihrer Leber oder Ihren Nieren haben
- wenn Sie Herzschwäche, einschließlich Herzrhythmusstörungen haben
- wenn Sie zu viel oder zu wenig Kalium, Calcium oder Magnesium im Blut haben
- wenn Sie bei Ihnen schweren Hautreaktionen auftreten (Juckreiz, Rötung der Haut und Atemprobleme)
- wenn Sie sich bei Ihnen Zeichen einer Nebenniereninsuffizienz befinden, der so genannte Cushing-Syndrom
- wenn Sie bestimmte Störungen wie Cholesterin-Hypercholesterolemie oder Triglyceride-Hypertriglyceridämie haben
- wenn Sie bei Ihnen nach der Anwendung von Fluconazole B. Braun jemals zu einem schweren Hautausschlag gekommen sind
- wenn Sie die Pilzinfektion nicht besser wird, da eine andere Therapie gegen Pilzinfektionen erforderlich sein könnte

Schwerwiegende Hautreaktionen, einschließlich des Arzneimittelelektans mit Eosinophilie und systemischen Symptome (DRESS-Syndrom), wurden in Verbindung mit einer Behandlung mit Fluconazole B. Braun berichtet. Beenden Sie die Anwendung von Fluconazole B. Braun und suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie eines der Symptome schwerer scherwiegenden Hautreaktionen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Bei Kindern und Jugendlichen (0 bis 17 Jahre)

Möglicherweise wurde dieses Arzneimittel zur Behandlung einer der folgenden Pilzinfektionen verordnet:

- Soor – Candida-Infektion der Schleimhäute, die Mundhöhle und den Rachen auskleiden
- Candida-Infektion von Blutbahn, inneren Organen (z.B. Herz und Lungen) oder Hamartakt
- Kryptoskleren-Meningitis – eine Pilzinfektion im Gehirn

Oder Sie haben Fluconazole B. Braun aus einem der folgenden Gründe verordnet:

- Zur Vorbeugung einer Candida-Infektion (wenn das Immunsystem des Patienten/der Patientin geschwächt ist und nicht richtig arbeitet)
- Um die Rückkehr einer Kryptoskleren-Meningitis zu verhindern

Was sollte vor der Anwendung von Fluconazole B. Braun beachten?

**Fluconazole B. Braun darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Fluconazol, gegen andere Arzneimittel zur Behandlung von Pilzinfektionen oder gegen einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind. Zu den Symptomen einer Allergie gehören Juckreiz, Hautrötung und Atemnot.
- wenn Sie Astemizol oder Terfenadin anwenden (Antihistaminika zur Behandlung von Allergien)
- wenn Sie Cisaprid anwenden (gegen Magenbeschwerden)
- wenn Sie Cisplatin anwenden (zur Behandlung von Herzmuskelbeschwerden)
- wenn Sie Echinidin anwenden (zur Behandlung von Herzmuskelbeschwerden)
- wenn Sie Erythromycin anwenden (ein Antibiotikum zur Behandlung von Infektionen)

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Fluconazole B. Braun anwenden.
- wenn Sie Probleme mit Ihrer Leber oder Ihren Nieren haben
- wenn Sie Herzschwäche, einschließlich Herzrhythmusstörungen haben
- wenn Sie zu viel oder zu wenig Kalium, Calcium oder Magnesium im Blut haben
- wenn Sie bei Ihnen schweren Hautreaktionen auftreten (Juckreiz, Rötung der Haut und Atemprobleme)
- wenn Sie sich bei Ihnen Zeichen einer Nebenniereninsuffizienz befinden, der so genannte Cushing-Syndrom
- wenn Sie bestimmte Störungen wie Cholesterin-Hypercholesterolemie oder Triglyceride-Hypertriglyceridämie haben
- wenn Sie bei Ihnen nach der Anwendung von Fluconazole B. Braun jemals zu einem schweren Hautausschlag gekommen sind
- wenn Sie die Pilzinfektion nicht besser wird, da eine andere Therapie gegen Pilzinfektionen erforderlich sein könnte

Schwarwiegende Hautreaktionen, einschließlich des Arzneimittelelektans mit Eosinophilie und systemischen Symptome (DRESS-Syndrom), wurden in Verbindung mit einer Behandlung mit Fluconazole B. Braun berichtet. Beenden Sie die Anwendung von Fluconazole B. Braun und suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie eines der Symptome schwerer scherwiegenden Hautreaktionen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Bei Kindern und Jugendlichen (0 bis 17 Jahre)

Möglicherweise wurde dieses Arzneimittel zur Behandlung einer der folgenden Pilzinfektionen verordnet:

- Soor – Candida-Infektion der Schleimhäute, die Mundhöhle und den Rachen auskleiden
- Candida-Infektion von Blutbahn, inneren Organen (z.B. Herz und Lungen) oder Hamartakt
- Kryptoskleren-Meningitis – eine Pilzinfektion im Gehirn

Oder Sie haben Fluconazole B. Braun aus einem der folgenden Gründe verordnet:

- Zur Vorbeugung einer Candida-Infektion (wenn das Immunsystem des Patienten/der Patientin geschwächt ist und nicht richtig arbeitet)
- Um die Rückkehr einer Kryptoskleren-Meningitis zu verhindern

Was sollte vor