



La technique de désinfection chirurgicale des mains doit être appliquée à des mains sèches et parfaitement propres. À l'arrivée dans la salle d'opération et après avoir enfilé la tenue du bloc opératoire (charlotte/coiffe/calot et masque), il est nécessaire de se laver les mains avec du savon et de l'eau. Après l'opération, lors du retrait des gants, les mains doivent être désinfectées avec une solution à base d'alcool ou lavées avec du savon et de l'eau si des résidus de talc ou des liquides biologiques sont présents (si le gant est percé, par exemple).


Les interventions chirurgicales peuvent être effectuées l'une après l'autre sans qu'il soit nécessaire de se laver les mains, à condition de respecter la technique de désinfection chirurgicale des mains (images 1 à 17).



1 Mettez environ 5 ml (3 doses) de désinfectant à base d'alcool dans la paume de votre main gauche.




2 Placez le bout des doigts de votre main droite dans le désinfectant pour décontaminer le dessous des ongles (5 sec.).



3 Images 3-7 : étalez le désinfectant sur l'avant-bras droit jusqu'au coude. Veillez à ce que toute la zone de peau soit couverte à l'aide de mouvements circulaires autour de l'avant-bras jusqu'à évaporation complète du désinfectant (10-15 sec.).



4 Voir légende image 3.




5 Voir légende image 3.



6 Voir légende image 3.



7 Voir légende image 3.




8 Mettez environ 5 ml (3 doses) de désinfectant à base d'alcool dans la paume de votre main droite, en utilisant le coude de votre autre bras pour actionner le distributeur.




9 Placez le bout des doigts de votre main gauche dans le désinfectant pour décontaminer le dessous des ongles (5 sec.).

PARTICIPEZ À LA
CAMPAGNE POUR
L'HYGIÈNE DES
MAINS




DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS


TECHNIQUE AVEC UNE SOLUTION
DE DÉSINFECTION À BASE D'ALCOOL




10
Étalez le désinfectant sur l'avant-bras gauche jusqu'au coude. Veillez à ce que toute la zone de peau soit couverte à l'aide de mouvements circulaires autour de l'avant-bras jusqu'à évaporation complète du désinfectant. (10-15 sec.).




11
Mettez environ 5 ml (3 doses) de désinfectant à base d'alcool dans la paume de votre main gauche. Frottez vos deux mains en même temps jusqu'aux poignets et veillez à suivre toutes les étapes représentées dans les images 12-17 (20-30 sec.).




12
Couvrez toute la surface des mains jusqu'au poignet avec un désinfectant à base d'alcool, en frottant vos paumes l'une contre l'autre avec un mouvement de rotation.




13
Frottez le dos de votre main gauche, y compris le poignet, en déplaçant la paume de votre main droite d'avant en arrière et vice versa.



14
Frottez vos paumes l'une contre l'autre, d'avant en arrière avec doigts entrelacés.



15
Frottez le dos des doigts en les maintenant dans la paume de l'autre main avec un mouvement latéral d'aller-retour.



16
Frottez avec un mouvement de rotation le pouce de votre main gauche dans la paume refermée de votre main droite et vice versa.




17
Une fois les mains sèches, une tenue et des gants chirurgicaux stériles peuvent être enfilés.

Répétez la séquence illustrée ci-dessus (durée moyenne, 60 sec.) en fonction du nombre de fois correspondant à la durée totale recommandée par le fabricant pour la préparation chirurgicale des mains avec un désinfectant à base d'alcool.

©World Health Organization 2009. All rights reserved.

PARTICIPEZ À LA
CAMPAGNE POUR
L'HYGIÈNE DES
MAINS



PRÉPARATION CHIRURGICALE DES MAINS

E649? :BF 6 2G64 F? 6 D@=FE:@? 56
5" D.? 764E:@? † 32D6 5x2=4@@=