

Ibuprofen B. Braun 600 mg oplossing voor infusie

ibuprofen

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Ibuprofen B. Braun en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe wordt dit medicijn toegedienen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Ibuprofen B. Braun en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Dit middel behoort tot een groep medicijnen die 'niet-steroidse anti-inflammatoire medicijnen' worden genoemd (NSAID's). Dit medicijn wordt gebruikt bij volwassenen voor de kortdurende symptomaticale behandeling van acute ontstekingen, wanneer toediening via de intraveneuze toedieningsweg klinisch is gecreëertvaardig als andere toedieningswegen niet mogelijk zijn.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet toedienen:

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Als u ooit last hebt gehad van kortademheid, astma, huiduitslag, jeukende loopneus of zwelling van het gezicht na voorafgaand ibuprofen, acetylsalicyzuur of andere geïkjerkte pijnstillers (NSAID's) te hebben ingenomen.
- Als u aan een aandoening lijdt waarbij u een grotere bloeding neiging heeft.
- Als u een actieve, of voorgeschreven hebt van recidiverende (twee of meer episodes) van maagzuur of maagbloeding.
- Als u ooit een bloeding hebt gehad of een perforatie in uw maag of darm bij innname van NSAID's.
- Als u een bloeding in de hersenen hebt gehad (cerebrovaskculaire bloeding) of een andere actieve bloeding.
- Als u lijdt aan ernstige nier-, lever- of hartproblemen.
- Als u lijdt aan ernstige uitdroging (veroorzaakt door diarree, diurese of overmatige vochtinname).
- Als u in de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Anti-inflammatoire/pijnstillante medicijnen zoals ibuprofen kunnen geraadplegt gaan met een klein verhoogd risico van hartaanval of beroerte, met name bij gebruik van hoge doseringen. De aanbevolen dosering of duur van de behandeling dient niet te worden overschat.

Huidreacties

Er zijn heftige huidreacties gemeld bij het gebruik van ibuprofen. Stop met het gebruik van Ibuprofen B. Braun en zoek direct medische hulp als u huiduitslag, schade (laesies) aan de slijmvliezen, blaren of andere reacties van allergie krijgt. Dit kunnen de eerste klachten van een zeer ernstige huidreactie zijn. Zie rubriek 4.

Besprek uw behandeling met uw arts voordat u Ibuprofen B. Braun ontvangt:

- Als u hartproblemen hebt zoals hartallen, angina (pijn op de borst), of als u een hart-aanval, bypassoperatie, perforeerde arteriële ziekte (slechte bloedloopomslag in de benen of voeten door verwaarmde of verstopste slagaderen), of een beroerte (inclusief mini-beroerte of transiente ischemic attack (TIA)) hebt of hebt gehad.
- Als u een hoge bloedglukose, diabetes, hoogscholestrol, een familiegeschiedenis van hartziekten of beroerte hebt, of u rookt.
- Als u olangs een grote operatie hebt ondergaan.
- Als u een zweer, bloeding of perforatie van de maag of de tweevlindergang darm hebt gehad. In deze gevallen zal uarts overwegen een beschermend medicijn voor te schrijven voor de maag.
- Als u astma of een andere ademhalingsstoornis heeft.
- Als u een infectie heeft - zie rubriek "Infecties".
- Als u een nier- of leveraandoening heeft, ouder bent dan 60 jaar of ibuprofen langdurig gebruikt, zal uw arts u regelmatig moeten controleren. Als uw arts vertelt u hoe vaak u gecontroleerd moet worden.

- Als uitgedroogd beroert, bijvoorbeeld door diarree, drink dan veel vloeistof en neem onmiddellijk contact op met uw arts omdat ibuprofen in dit geval nieren kan verorzaaken als gevolg van uitdroging.

- Als u een zwanger bent of een terugkerende zwangerschap heeft, of u een beroerte of transiente ischemic attack (TIA) hebt of hebt gehad.

- Als u een hoge bloedglukose, diabetes, hoogscholestrol, een familiegeschiedenis van hartziekten of beroerte hebt, of u rookt.

- Als u olangs een grote operatie hebt ondergaan.

- Als u een zweer, bloeding of perforatie van de maag of de tweevlindergang darm hebt gehad. In deze gevallen zal de arts overwegen een beschermend medicijn voor te schrijven voor de maag.

- Als u astma of een andere ademhalingsstoornis heeft.

- Als u een infectie heeft - zie rubriek "Infecties".

- Als u een nier- of leveraandoening heeft, ouder bent dan 60 jaar of ibuprofen langdurig gebruikt, zal uw arts u regelmatig moeten controleren. Als uw arts vertelt u hoe vaak u gecontroleerd moet worden.

- Als uitgedroogd beroert, bijvoorbeeld door diarree, drink dan veel vloeistof en neem onmiddellijk contact op met uw arts omdat ibuprofen in dit geval nieren kan verorzaaken als gevolg van uitdroging.

- Als u een zwanger bent of een terugkerende zwangerschap heeft, of u een beroerte of transiente ischemic attack (TIA) hebt of hebt gehad.

- Als u een hoge bloedglukose, diabetes, hoogscholestrol, een familiegeschiedenis van hartziekten of beroerte hebt, of u rookt.

- Als u olangs een grote operatie hebt ondergaan.

- Als u een zweer, bloeding of perforatie van de maag of de tweevlindergang darm heeft gehad. In deze gevallen zal de arts overwegen een beschermend medicijn voor te schrijven voor de maag.

- Als u astma of een andere ademhalingsstoornis heeft.

- Als u een infectie heeft - zie rubriek "Infecties".

- Als u een nier- of leveraandoening heeft, ouder bent dan 60 jaar of ibuprofen langdurig gebruikt, zal uw arts u regelmatig moeten controleren. Als uw arts vertelt u hoe vaak u gecontroleerd moet worden.

- Als uitgedroogd beroert, bijvoorbeeld door diarree, drink dan veel vloeistof en neem onmiddellijk contact op met uw arts omdat ibuprofen in dit geval nieren kan verorzaaken als gevolg van uitdroging.

- Als u een zwanger bent of een terugkerende zwangerschap heeft, of u een beroerte of transiente ischemic attack (TIA) hebt of hebt gehad.

- Als u een hoge bloedglukose, diabetes, hoogscholestrol, een familiegeschiedenis van hartziekten of beroerte hebt, of u rookt.

- Als u olangs een grote operatie hebt ondergaan.

- Als u een zweer, bloeding of perforatie van de maag of de tweevlindergang darm heeft gehad. In deze gevallen zal de arts overwegen een beschermend medicijn voor te schrijven voor de maag.

- Als u astma of een andere ademhalingsstoornis heeft.

- Als u een infectie heeft - zie rubriek "Infecties".

- Als u een nier- of leveraandoening heeft, ouder bent dan 60 jaar of ibuprofen langdurig gebruikt, zal uw arts u regelmatig moeten controleren. Als uw arts vertelt u hoe vaak u gecontroleerd moet worden.

- Als uitgedroogd beroert, bijvoorbeeld door diarree, drink dan veel vloeistof en neem onmiddellijk contact op met uw arts omdat ibuprofen in dit geval nieren kan verorzaaken als gevolg van uitdroging.

- Als u een zwanger bent of een terugkerende zwangerschap heeft, of u een beroerte of transiente ischemic attack (TIA) hebt of hebt gehad.

- Als u een hoge bloedglukose, diabetes, hoogscholestrol, een familiegeschiedenis van hartziekten of beroerte hebt, of u rookt.

- Als u olangs een grote operatie hebt ondergaan.

- Als u een zweer, bloeding of perforatie van de maag of de tweevlindergang darm heeft gehad. In deze gevallen zal de arts overwegen een beschermend medicijn voor te schrijven voor de maag.

- Als u astma of een andere ademhalingsstoornis heeft.

- Als u een infectie heeft - zie rubriek "Infecties".

- Als u een nier- of leveraandoening heeft, ouder bent dan 60 jaar of ibuprofen langdurig gebruikt, zal uw arts u regelmatig moeten controleren. Als uw arts vertelt u hoe vaak u gecontroleerd moet worden.

- Als uitgedroogd beroert, bijvoorbeeld door diarree, drink dan veel vloeistof en neem onmiddellijk contact op met uw arts omdat ibuprofen in dit geval nieren kan verorzaaken als gevolg van uitdroging.

- Als u een zwanger bent of een terugkerende zwangerschap heeft, of u een beroerte of transiente ischemic attack (TIA) hebt of hebt gehad.

- Als u een hoge bloedglukose, diabetes, hoogscholestrol, een familiegeschiedenis van hartziekten of beroerte hebt, of u rookt.

- Als u olangs een grote operatie hebt ondergaan.

- Als u een zweer, bloeding of perforatie van de maag of de tweevlindergang darm heeft gehad. In deze gevallen zal de arts overwegen een beschermend medicijn voor te schrijven voor de maag.

- Als u astma of een andere ademhalingsstoornis heeft.

- Als u een infectie heeft - zie rubriek "Infecties".

- Als u een nier- of leveraandoening heeft, ouder bent dan 60 jaar of ibuprofen langdurig gebruikt, zal uw arts u regelmatig moeten controleren. Als uw arts vertelt u hoe vaak u gecontroleerd moet worden.

- Als uitgedroogd beroert, bijvoorbeeld door diarree, drink dan veel vloeistof en neem onmiddellijk contact op met uw arts omdat ibuprofen in dit geval nieren kan verorzaaken als gevolg van uitdroging.

- Als u een zwanger bent of een terugkerende zwangerschap heeft, of u een beroerte of transiente ischemic attack (TIA) hebt of hebt gehad.

- Als u een hoge bloedglukose, diabetes, hoogscholestrol, een familiegeschiedenis van hartziekten of beroerte hebt, of u rookt.

- Als u olangs een grote operatie hebt ondergaan.

- Als u een zweer, bloeding of perforatie van de maag of de tweevlindergang darm heeft gehad. In deze gevallen zal de arts overwegen een beschermend medicijn voor te schrijven voor de maag.

- Als u astma of een andere ademhalingsstoornis heeft.

- Als u een infectie heeft - zie rubriek "Infecties".

- Als u een nier- of leveraandoening heeft, ouder bent dan 60 jaar of ibuprofen langdurig gebruikt, zal uw arts u regelmatig moeten controleren. Als uw arts vertelt u hoe vaak u gecontroleerd moet worden.

- Als uitgedroogd beroert, bijvoorbeeld door diarree, drink dan veel vloeistof en neem onmiddellijk contact op met uw arts omdat ibuprofen in dit geval nieren kan verorzaaken als gevolg van uitdroging.

- Als u een zwanger bent of een terugkerende zwangerschap heeft, of u een beroerte of transiente ischemic attack (TIA) hebt of hebt gehad.

- Als u een hoge bloedglukose, diabetes, hoogscholestrol, een familiegeschiedenis van hartziekten of beroerte hebt, of u rookt.

- Als u olangs een grote operatie hebt ondergaan.

- Als u een zweer, bloeding of perforatie van de maag of de tweevlindergang darm heeft gehad. In deze gevallen zal de arts overwegen een beschermend medicijn voor te schrijven voor de maag.

- Als u astma of een andere ademhalingsstoornis heeft.

- Als u een infectie heeft - zie rubriek "Infecties".

- Als u een nier- of leveraandoening heeft, ouder bent dan 60 jaar of ibuprofen langdurig gebruikt, zal uw arts u regelmatig moeten controleren. Als uw arts vertelt u hoe vaak u gecontroleerd moet worden.

- Als uitgedroogd beroert, bijvoorbeeld door diarree, drink dan veel vloeistof en neem onmiddellijk contact op met uw arts omdat ibuprofen in dit geval nieren kan verorzaaken als gevolg van uitdroging.

- Als u een zwanger bent of een terugkerende zwangerschap heeft, of u een beroerte of transiente ischemic attack (TIA) hebt of hebt gehad.

- Als u een hoge bloedglukose, diabetes, hoogscholestrol, een familiegeschiedenis van hartziekten of beroerte hebt, of u rookt.

- Als u olangs een grote operatie hebt ondergaan.

- Als u een zweer, bloeding of perforatie van de maag of de tweevlindergang darm heeft gehad. In deze gevallen zal de arts overwegen een beschermend medicijn voor te schrijven voor de maag.

- Als u astma of een andere ademhalingsstoornis heeft.

- Als u een infectie heeft - zie rubriek "Infecties".

- Als u een nier- of leveraandoening heeft, ouder bent dan 60 jaar of ibuprofen langdurig gebruikt, zal uw arts u regelmatig moeten controleren. Als uw arts vertelt u hoe vaak u gecontroleerd moet worden.

- Als uitgedroogd beroert, bijvoorbeeld door diarree, drink dan veel vloeistof en neem onmiddellijk contact op met uw arts omdat ibuprofen in dit geval nieren kan verorzaaken als gevolg van uitdroging.

- Als u een zwanger bent of een terugkerende zwangerschap heeft, of u een beroerte of transiente ischemic attack (TIA) hebt of hebt gehad.

- Als u een hoge bloedglukose, diabetes, hoogscholestrol, een familiegeschiedenis van hartziekten of beroerte hebt, of u rookt.

- Als u olangs een grote operatie hebt ondergaan.

- Als u een zweer, bloeding of perforatie van de maag of de tweevlindergang darm heeft gehad. In deze gevallen zal de arts overwegen een beschermend medicijn voor te schrijven voor de maag.

- Als u astma of een andere ademhalingsstoornis heeft.

- Als u een infectie heeft - zie rubriek "Infecties".

- Als u een nier- of leveraandoening heeft, ouder bent dan 60 jaar of ibuprofen langdurig gebruikt, zal uw arts u regelmatig moeten controleren. Als uw arts vertelt u hoe vaak u gecontroleerd moet worden.

- Als uitgedroogd beroert, bijvoorbeeld door diarree, drink dan veel vloeistof en neem onmiddellijk contact op met uw arts omdat ibuprofen in dit geval nieren kan verorzaaken als gevolg van uitdroging.

- Als u een zwanger bent of een terugkerende zwangerschap heeft, of u een beroerte of transiente ischemic attack (TIA) hebt of hebt gehad.

- Als u een hoge bloedglukose, diabetes, hoogscholestrol, een familiegeschiedenis van hartziekten of beroerte hebt, of u rookt.

- Als u olangs een grote operatie hebt ondergaan.

- Als u een zweer, bloeding of perforatie van de maag of de tweevlindergang darm heeft gehad. In deze gevallen zal de arts overwegen een beschermend medicijn voor te schrijven voor de maag.

- Als u astma of een andere ademhalingsstoornis heeft.

- Als u een infectie heeft - zie rubriek "Infecties".

- Als u een nier- of leveraandoening heeft, ouder bent dan 60 jaar of ibuprofen langdurig gebruikt, zal uw arts u regelmatig moeten controleren. Als uw arts vertelt u hoe vaak u gecontroleerd moet worden.

- Als uitgedroogd beroert, bijvoorbeeld door diarree, drink dan veel vloeistof en neem onmiddell

Ibuprofen B. Braun content du sodium.
Ce médicament contient 360 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par flacon. Cela équivaut à 18,0% de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte.

3. Comment prendre Ibuprofen B. Braun ?

Ce médicament ne vous est prescrit que par un médecin et ne vous est administré que par un médecin ou une infirmière dans un environnement doté d'un équipement approprié.

Chez l'adulte, la dose recommandée est de 600 mg par voie intraveineuse (goutte-à-goutte dans une veine). Une autre dose de 600 mg peut être administrée à 6 heures plus tard, en fonction de l'intensité de la douleur et de la réaction au traitement. La dose quotidienne maximale de 1 200 mg ne doit pas être dépassée.

Pour atténuer les symptômes, la dose efficace la plus faible devra être utilisée pendant la durée du traitement, mais si elle est associée à une infection et que les symptômes (tels que fièvre et douleur) persistent ou qu'ils s'aggravent, consultez votre médecin (voir rubrique 2). Votre médecin vellera également à ce que vous soyez correctement hydraté(e), afin de minimiser le risque d'effets secondaires rénaux.

L'utilisation de ce médicament doit se limiter aux situations dans lesquelles l'administration par voie orale est inappropriée. Les patients doivent dès que possible passer à un traitement par voie orale.

Ce médicament est indiqué pour le traitement aigu à court terme uniquement et ne doit pas être utilisé pendant plus de 3 jours.

Mode d'administration

Voie intraveineuse. La solution doit être administrée en perfusion intraveineuse de 30 minutes. Ce médicament est indiqué pour une utilisation en dose unique. Inspectez la solution avant utilisation. Elle doit être jetée en cas de présence de particules ou de décoloration.

Si vous avez pris plus d'Ibuprofen B. Braun que vous n'aurez dû :

Si vous sentez avoir reçu plus d'ibuprofène que vous n'auriez dû, consultez immédiatement votre médecin ou votre infirmière.

Les symptômes peuvent inclure nausées, douleurs abdominales, vomissements (pouvant contenir des traces de sang), maux de tête, bourdonnements dans les oreilles, confusion et de mouvements oculaires instables. À fortes doses, les symptômes suivants ont été signalés : somnolence, douleur thoracique, palpitations, perte de conscience, convulsions (principalement chez les enfants), trouble de la coordination des mouvements musculaires, faiblesse et étourdissements, sang dans les urines, sensation de froid corporel et problèmes respiratoires.

Vous pourrez également présenter une baisse de la pression artérielle, une coloration bleutée de la peau et des muqueuses (cyanose), des saignements au niveau de l'estomac et des intestins

ainsi que des problèmes de fonctionnement du foie et des reins.

Si vous avez utilisé ou pris trop d'Ibuprofen B. Braun, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien, ou le Centre Anti-poison (070/245245).

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmière.

4. Quels sont les effets indésirables événuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables peuvent être minimisés en utilisant la dose efficace la plus faible pendant la période la plus courte possible nécessaire pour traiter les symptômes. Vous pouvez présenter un ou plusieurs des effets indésirables connus associés auxAINS (voir ci-dessous). Si vous présentez l'un de ces effets indésirables, arrêtez d'utiliser ce médicament et consultez un médecin dès que possible. Les patients âgés qui utilisent ce médicament présentent un risque plus élevé de développer des problèmes associés aux effets indésirables.

Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont gastro-intestinaux (touchant l'estomac et les intestins). Des ulcères gastroduodenaux (ulcères de l'estomac ou des intestins)

tels des perforations (trous dans la paroi de l'estomac ou des intestins) ou des saignements au niveau de l'estomac ou des intestins, parfois fatals, peuvent survenir, en particulier chez les patients âgés. Des nausées, des vomissements, une diarrhée, des flatulences, une constipation, une indigestion, des douleurs abdominales, des sels goudronneux, des vomissements contenant du sang, une stomatite ulcéreuse (inflammation de la muqueuse buccale avec ulcération), une aggravation de la colite (inflammation du gros intestin) et de la maladie de Crohn. Moins fréquemment, une gastrite (inflammation de l'estomac) a été observée. Le risque de saignement au niveau de l'estomac et des intestins est particulièrement dépendant de la dose et de la durée d'utilisation.

Un œdème (accumulation de liquide dans les tissus), une pression artérielle élevée et une insuffisance cardiaque ont été rapportés en association avec un traitement par AINS. Les médicaments comme l'ibuprofène peuvent être associés à une légère augmentation du risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral.

Dans de très rares cas, on a rapporté des réactions allergiques sévères (y compris réactions au site de perfusion, choc anaphylactique), ainsi que des effets indésirables graves au niveau de la peau tels que des réactions bulleuses (éczéma), notamment syndrome de Stevens-Johnson et néphrite épidémique (syndrome de Euvillot), érythème multi-forme et alopecie (perte de cheveux), sensibilité à la lumière et une vascularite allergique (inflammation d'un vaisseau sanguin).

Dans de rares cas, une aggravation de l'inflammation liée aux infections (par ex. développement d'une fascite nécrosante) coïncidant avec l'utilisation des AINS a été décrite.

Dans des cas exceptionnels, des infections sévères de la peau et des complications des tissus mous peuvent survenir au cours d'une infection par le virus de la varicelle.

Effets indésirables très fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

- Fatigue ou insomnie, maux de tête et étourdissements.
- Brûlures d'estomac, douleurs abdominales, nausées, vomissements, flatulences, diarrhée, constipation et légères pertes de sang dans l'estomac et les intestins pouvant causer une anémie dans des cas exceptionnels.

Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

- Vertiges.
- Emphysme cutané.
- Douleur et sensation de brûlure au site d'administration.

- Ulcère gastro-intestinal, s'accompagnant potentiellement d'un saignement et d'une perforation. Stomatite ulcéreuse, exacerbation d'une cicatrice ou une maladie de Crohn.

Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

- Insomnie (difficultés à dormir), agitation, irritabilité ou fatigue, anxiété et névrose.

• Troubles visuels.

• Acouphènes (intempes ou bourdonnements dans les oreilles).

• Inflammation de la muqueuse de l'estomac et formation d'œdèmes, en particulier chez les patients présentant une pression artérielle élevée ou des problèmes rénaux, syndrome néphrotique, néphrite interstitielle éventuellement accompagnée d'une insuffisance rénale aigüe.

• Urticaire, purpura (y compris purpura allergique), éruption cutanée.

• Rétrécissement de l'esophag (varices sanguines de l'esophag), complications de diverticules du gros intestin, colite hémorragique non spécifique.

• Diarrhée (élimination de la peau ou du blanc des yeux, dysfonctionnement du foie, atteinte

du foie, en particulier dans le cadre d'un traitement à long terme, hépatite aiguë (inflammation du foie).

• Réactions psychotiques, nervosité, irritabilité, confusion ou désorientation et dépression.

• Rigidité de la nuque.

Effets indésirables très rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000) :

- Troubles de la formation des cellules sanguines (anémie, leucopénie, thrombocytopénie, pancytopenie et agranulocytose).

Les premiers symptômes sont les suivants : fièvre, mal de gorge, plaies superficielles de la bouche, symptômes pseudo-grippaux, fatigue sévère, saignement du nez et de la peau.

• Palpitations (battements cardiaques rapides), insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde.

• Hypertension artérielle.

• Méniginite aiguë (rigidité de la nuque, céphalées, nausées, vomissements, fièvre ou confusion). Les patients présentant des affections auto-immunes, réactions allergiques sévères (dyspnée du visage avec gonflement de la langue, gonflement de la gorge avec constriction des voies respiratoires, difficultés à respirer, battements cardiaques rapides, diminution de la tension artérielle et choc menaçant le pronostic vital).

Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

- Insuffisance hépatique.

• Réactions au site d'injection, notamment gonflement, hématoème, bleuissement ou saignement.

• Une réaction cutanée sévère appelée syndrome d'hypersensibilité ferrolymphatique (DRESS syndrome) peut survenir. Les symptômes de hypersensibilité sont : éruption cutanée, fièvre, gonflement des ganglions lymphatiques (un type de globules blancs).

• Erption éthylique (éruption rouge avec des masques sous la peau et des clinques paroxystiques situées dans les périodes, sur le tronc et aux extrémités supérieures, accompagnée de fièvre à l'instigation du traitement) (notre éruption hématoïde aigüe généralisée). Si vous développez ces symptômes, arrêtez d'utiliser Ibuprofen B. Braun et consultez immédiatement un médecin. Voir également rubrique 2.

Déclaration : effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, R-1000 Bruxelles Madou – site internet : www.notifieuneffetindesirable.be – e-mail : aadr@amps.be.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Ibuprofen B. Braun

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Le produit doit être utilisé immédiatement après l'ouverture.

A usage unique. Toute solution inutilisée doit être éliminée.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette après EXP.

La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des particules ou une décoloration.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Ibuprofen B. Braun

La substance active est l'Ibuprofène. Chaque flacon de 100 ml contient 600 mg d'Ibuprofène.

Environ 100 mg d'Ibuprofène sont dissous dans l'eau et 900 mg sont dissous dans l'alcool.

Le contenu est identique pour les flacons de 200 ml et 500 ml.

Le flacon est en verre et est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.

Il existe également une version en plastique.

Le flacon est étiqueté avec une étiquette blanche.